

- ___ 19 Zodra pijn opkomt neem ik medicijnen om het te verminderen.
- ___ 20 Ik voel druk of beklemming op mijn borst wanneer ik pijn heb.
- ___ 21 Wanneer ik pijn voel, denk ik dat ik ernstig ziek zou kunnen zijn.
- ___ 22 Tijdens perioden met pijn is het moeilijk voor me om aan iets anders dan de pijn te denken.
- ___ 23 Ik vermijd belangrijke bezigheden wanneer ik pijn lijd.
- ___ 24 Als ik pijn bespeur, voel ik me duizelig of slap.
- ___ 25 Pijngevoelens zijn angstaanjagend.
- ___ 26 Als ik pijn lijd, denk ik voortdurend aan de pijn.
- ___ 27 Ik neem medicijnen in als ik weet dat ik iets moet doen dat meestal pijn erger maakt.
- ___ 28 Ik kan moeilijk op adem komen wanneer ik pijngevoelens heb.
- ___ 29 Ik ben als de dood voor pijn.
- ___ 30 Ik heb last van ongewenste gedachten wanneer ik pijn heb.
- ___ 31 Als de gelegenheid zich voordoet om iets te doen wat ik leuk vind, doe ik het zelfs wanneer het pijn oproept.
- ___ 32 Van pijn word ik misselijk.
- ___ 33 Wanneer pijn sterk opkomt, denk ik dat ik verlamd of meer gehandicapt zou kunnen worden.
- ___ 34 Ik vind het moeilijk om me te concentreren wanneer ik pijn lijd.
- ___ 35 In tijden waarin de pijn ernstiger is zoek ik geruststelling dat ik in orde ben.
- ___ 36 Ik vind het moeilijk mijn lichaam tot rust te laten komen na perioden met pijn.
- ___ 37 Ik maak me zorgen wanneer ik pijn heb.
- ___ 38 Ik heb last van mijn maag wanneer ik pijn ervaar.
- ___ 39 Ik probeer bezigheden te vermijden die pijn veroorzaken.
- ___ 40 Ik kan redelijk helder denken, zelfs als ik hevige pijn ervaar.